

فرآیند جداسازی بیمار از ونتیلاتور

چک دستور پزشک مبنی بر جداسازی بیمار از ونتیلاتور توسط پرستار

شستشو و ضدعفونی کردن دستها توسط پرستار

انجام فیزیوتراپی قفسه سینه، ساکشن قبل از جداسازی بیمار توسط پرستار و اطمینان از پاک بودن راه هوایی

آماده کردن وسایل اکسیژن درمانی بر بالین بیمار توسط پرستار

قرار دادن بیمار در وضعیت نیمه نشسته و جداسازی وی از دستگاه و وصل اکسیژن به بیمار توسط پرستار

آیا بیمار جداسازی از ونتیلاتور را تحمل می کند؟

خیر

بلی

وصل مجدد بیمار به ونتیلاتور با اطلاعات قبلی و اطلاع به پزشک و ثبت در پرونده بیمار

شستشو و ضدعفونی کردن دستها توسط پرستار

بررسی مداوم سطح هوشیاری، علائم حیاتی و رنگ مخاط توسط پرستار

تماس با آزمایشگاه جهت آماده کردن دستگاه ABG

گرفتن نمونه گاز خون از بیمار، قرار دادن یخ، شستشوی دستها و ثبت در سیستم HIS

بردن نمونه خون داخل ظرف یخ به آزمایشگاه توسط خدمه و پیگیری جواب توسط پرستار

تماس با پزشک و مطلع نمودن ایشان از نتیجه آن

آیا جواب آزمایش قابل قبول می باشد؟

خیر

بلی

وصل مجدد بیمار به دستگاه ونتیلاتور توسط پرستار

تحت نظر قرار دادن بیمار از نظر قلبی-تنفسی

نوشتن دستور کتبی وصل مجدد بیمار به ونتیلاتور توسط پزشک پس از حضور در بخش

ثبت در گزارش پرستاری و کاردکس

صاحبان فرآیند: پزشک، پرستار، خدمه

مدت زمان انجام فرآیند: ۲۰-۳۰ دقیقه