



بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب

موضوع: عفونت ادراری در کودکان

تهیه کننده: مهین رهسپار

مسئول علمی بخش: دکتر فتوحی کیا

منبع: پرستاری کودکان ونگ

مترجم شهناز شوفی شهناز سنجرى ویرایش

۲۰۱۹

کد مستند سازی: pph.nicu.13



زمستان ۱۴۰۳

عفونت سیستم ادراری ممکن است با

علائم یا بدون علائم باشد

شیوع عفونت ادراری در نوزادان بین دو

تا چهار ماهگی می باشد

دخترها بیشتر در معرض عفونت سیستم

ادراری نسبت به پسرها هستند

نواحی مختلف باعث ایجاد عفونت

سیستم ادراری هستند از جمله نواحی

مقعد رینه شایع ترین است

علائم بی قراری در نوزادان تب و لرزش

اندامها بی قراری در ادرار کردن بوی

شدید و تند از ادرار قرمزی ناحیه پرینه و

تناسلی

● دارو درمانی

استفاده از آنتی بیوتیکها به دستور پزشک

و بر اساس نتایج کشت ادرار و در صورت

بهبود نیافتن و تب استفاده از قطره

استامینوفن و شربت بروفن طبق دستور

پزشک

● پیامدهای احتمالی ناشی از درمان

در بعضی مواقع بر اثر استفاده از آنتی

بیوتیک نوزاد دچار استفراغ بی اشتهاى

اسهال و یا کهمیر می شود که در صورت

هرگونه علائم به پزشک مراجعه شود و به

صورت خودسرانه دارو را قطع نکند

● آموزش عوارض خطر

بهداشت فردی ضعیف مادر و استفاده از دستمال مرطوب و پمپرز تنگ و تعویض به موقع پمپرز استفاده از شامپو و روغن و لوسیون های مخصوص حمام ی تواند به دفعات باعث عفونت ادراری در نوزادان شود و عوارض ناخواسته در سیستم تناسلی و کلیوی به وجود آورد

● مراقبت در منزل

۱- شیردهی مکرر نوزاد

۲- در صورت مصرف شیر مادر در از نوشیدنی های کربنات دار و کافئین دار خودداری کند

۳- مصرف ملین جهت جلوگیری از یبوست

۴- رعایت بهداشت ناحیه پرینه و شستشو از جلو به عقب رعایت بهداشت فرد مراقبت کننده

۵- اجتناب از پوشاندن پمپرز کوچک و تنگ و یا شورت پلاستیکی تنگ و کوچک و یا تعویض به موقع پمپرز تکرار در شیردهی و مایعات کافی عدم استفاده از دستمال مرطوب در هنگام تمیز کردن و شستشوی مکرر ناحیه تناسلی با آب ولرم از جلو به عقب چندین بار در روز

● آموزش مراجعه به پزشک پس از

ترخیص

آموزش در مصرف دارو طبق دستور پزشک و دوهفته پس از قطع دارو آزمایش کشت ادرار تکرار شود

