

یا من اسمہ دوائ و ذکرہ شفاء



بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)
داراب

حاملگی نابجا

تهیه کننده: عرفانه پورغضنفری

مسئول علمی بخش: دکتر طالبی

منبع: برونرو سودارث 2022


پاییز 1402

کد مستند سازی: 54.pph.ws



حاملگی خارج رحمی


نقاط احتمالی جنین در حاملگی خارج رحمی



موقعیت جنین در رحم
در حالت طبیعی

منابع:

مامایی و بیماری های زنان دتفورث



حاملگی نابجا

اگر لانه گزینی در هر جایی به جز لایه داخلی رحم صورت بگیرد آن را حاملگی نابجا می نامند.

بعد از ابتلا یک مورد حاملگی نابجا احتمال ابتلا به حاملگی سابقه عفونت تناسلی نابجای بعدی تقریباً 10 درصد است

عواملی که باعث حاملگی نابجا می شوند:

حاملگی نابجه جای قبلی

آسیب دیدگی قبلی لوله های رحم

عقیم سازی لوله ای

سابقه عفونت تناسلی

استعمال دخانیات

چسبندگی دور لوله ای (عفونت بعد از سقط اندومترئوز -

التهاب آپاندیسیت)

عمل جراحی لوله ها

وجود IUO

علائم و نشانه ها:

عفونت لنگی

استفاده از داروهای باروری برای التهاب تخمک گذاری

درد لگن و شکمی 95 درصد

خونریزی

برقراری رنگ پریدگی

- عرق سرد

- علائم گوارشی



تشخیص:

حساسیت شکمی و لگنی:

در مراحل اولیه حاملگی نابجه که هنوز پارگی رخ نداده است حساسیت ناشایع است در صورت وقوع پارگی در هنگام معاینه شکمی و واژینال و در هنگام حرکت دادن سرویکس حساسیت بسیار شایع ایجاد میشود علائم حیاتی در صورت خونریزی در ضمن پارگی لوله به صورت افت فشارخون و کاهش فرمان قلب می باشد



بتاهش سی جی:

که در 99 درصد موارد مثبت می شود.

سونوگرافی: واژینال - شکمی

لاپاراسکوپي - لاپاراتومی

تغییرات نابجای پروژسترون سرم



درمان:

درمان طبی داروی متوترکسات

درمان جراحی:

برداشتن لوله رحم

بازکردن لوله و خارج کردن توده و بخیه زدن محل توده

کمتر از 2 سی سی در یک سوم دیستال لوله

فالوپ واقع هستند.

