



بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)

داراب

سزارین

تهیه کننده: عرفانه پورغضنفری

مسئول علمی بخش: دکتر طالبی

منبع: برونرو سودارت 2022

پاییز 1402

کد مستند سازی: pph.ws.18.2

بارکد:



رژیم غذایی معمولی داشته باشید جهت نرم شدن روده

مادر مایعات، سبزیجات و میوه جات استفاده نمایید
در صورت بی حسی اسپینال جهت جلوگیری از سردرد
و کمردرد یک هفته اول بعد از عمل مایعاتی همچون
قهوه نسکافه و چای پررنگ مفید خواهد بود.

برای انجام آزمایش غربالگری جهت بررسی کم کاری
تیروئید نوزاد از ۳ تا ۵ روز بعد از تولد به نزدیکترین
مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.

چهل روز بعد از زایمان به نزدیکترین مرکز بهداشتی
درمانی مراجعه نمایید و یکی از روشهای پیشگیری از
بارداری را انتخاب کنید.

از بلند کردن اجسام سنگین به مدت دو هفته و به مدت
۴۰ روز از داشتن نزدیکی و فعالیت سنگین خودداری
کنید.

جهت ادای فرایض دینی تا قبل از ده روز غسل نفاس
انجام دهید و برای اقامه نماز بعد از ده روز در صورت
داشتن خونریزی احکام استحاضه طبق رساله موجود را
رعایت فرمایید.

ورزش برای برگشت سریع تر ماهیچههای شکم و سایر
قسمتها به حالت اولیه توصیه میشود و در خانمها با
زایمان طبیعی یک هفته بعد و در سزارین ۶ هفته بعد با
نظر پزشک شروع میشود.

به وضعیت صحیح شیردهی و گذاشتن صحیح شیرخوار
به پستان طبق آموزشهای داده شده در بیمارستان و
برگه آموزش شیردهی توجه شود.

مصرف موادی مثل صابون و کرم که ممکن است به نوک
پستانها آسیب رساند اجتناب کنید.

جهت جلوگیری از التهاب پستان و عفونت، آن شیر
دادن را به طور مداوم ادامه دهید.

طولانی کردن فواصل شیردهی باعث کاهش تولید شیر و
تورم پستانها می شود.

همچنین پرستار به شما آموزش خواهد داد که چگونه سرفه

کنید با تمرینهای منظم تنفس انجام دهید تا مایعات جمع
شده در ریه ها تخلیه شود.

دقت کنید که هنگام سرفه و نیز عطسه و خنده دستها یا یک
بالش روی محل زخم بگذارید. سرم و سوند ادراری در عرض
۱۲ ساعت پس از جراحی برداشته خواهد شد و شما به محض
آنکه میل به خوردن داشته باشید میتوانید غذا بخورید.

توصیه های هنگام ترخیص:

حداکثر پس از ۴۸-۲۴ ساعت بعد از عمل جراحی در صورت
نداشتن مشکل تب خونریزی و علائم غیر طبیعی مانند
خونریزی، ترشحات خون مردگی و کبودی محل عمل (با نظر
پزشک مرخص خواهید شد.

نسخه دارویی توسط پزشک نوشته و به شما داده می شود.

لازم است داروها از داروخانه تهیه و طبق دستورات پزشک
در منزل استفاده نمایید

زمان مراجعه بعدی به پزشک معالج به شما یادآوری خواهد
شد جهت کشیدن بخیهها ۷ تا ۱۰ روز بعد از عمل طبق دستور
به پزشک معالج مراجعه نمایید.

محل بخیه ها را با آب و شامپو بچه شسته و خشک نگه
دارید.

لباسهای زیر و پد خود را مرتب تعویض کنید.

از پوشیدن لباسهای تنگ و نایلونی که موجب عرق کردن
می شود خودداری کنید به دلیل این که ناحیه عمل باید در
معرض هوا قرار گیرد.

بیمارانی که دارای شکم بزرگ هستند احتمال اینکه شکم بر
روی محل بخیه قرار گیرد و باعث عفونت شود زیاد می باشد
لذا بهتر است از شکم بندهای طبی مناسب استفاده نمایید به
طوری که محل بخیه حتما خارج از شکم بند باشد.

ختم حاملگی از طریق عمل جراحی شکم سزارین نام دارد.

برخی از دلایل سزارین

حاملگی چندقلویی :

در یک خانم باردار دو قلو اگر جنینها خیلی زود بخواهند متولد شوند یا حالت و وضعیت خوبی در رحم نداشته باشند و یا مشکلات دیگر پیش بیاید ممکن است سزارین ضرورت یابد. احتمال میزان سزارین در حاملگی چندقلویی با افزایش تعداد قل ها افزایش می یابد

ناموفق بودن مراحل لیبر زایمان طبیعی :

انقباضات رحمی ممکن است نتواند باعث باز شدن کافی دهانه رحم جهت حرکت جنین به داخل واژن شود.

دلایل جنینی :

به عنوان مثال بند ناف ممکن است دچار پیچیدگی و یا تحت فشار باشد و یا مانیتورینگ قلب جنین غیر طبیعی قلب جنین را نشان دهد.

مشکلات جفتی جنین درشت موقعیت نامناسب جنین در رحم

عفونت ها و بیماریهای مادری

مثل هریس یا ایدز و مشکلات مادری مثل دیابت یا فشار بالا

اگر زایمان قبلی من به روش سزارین بوده آیا من مجبور به سزارین هستم ؟

زنانی که در زایمان های قبلی سزارین شده اند، ممکن است بتوانند زایمان واژینال داشته باشند.

با مسئول پرونده بهداشتی خود درباره امکاناتی که برای شما وجود دارد، صحبت کنید.

سزارین نیاز به چه اقداماتی دارد؟

قبل از انجام سزارین یک پرستار شما را برای عمل جراحی آماده خواهد کرد. کلیه اجسام فلزی و طلا جواهرات شما خارج میشود یک آنژیوکت داخل ورید شما روی دست یا بازو شما قرار می گیرد این کار اجازه میدهد شما در طی جراحی مایعات و دارو بگیرید.

موهای ناحیه پوبیک کوتاه می شود.

شما دارو خواهید گرفت برای جلوگیری از عفونت یک سوند برای شما از مجرای ادرار تا مثانه قرار می دهند.

این سوند برای خالی نگه داشتن مثانه شما در طی جراحی میباشد تا مثانه آسیب نبیند.

چه نوع بیهوشی در طی سزارین استفاده خواهد شد؟

اگر بیهوشی عمومی استفاده شده ،باشد شما در طی زایمان به هوش نخواهید بود.

بی حسی اسپینال:

برای انجام این کار بیمار در حالت نشسته یا خوابیده به پهلو قرار میگیرد ابتدا روش کار را برای بیمار توضیح داده و از بیمار میخواهیم با گرفتن زانو ها و دادن شکم به درون و چسباندن چانه به سینه با پرستار بیهوشی همکاری کند با رعایت این نکات توسط بیمار ناحیه تزریق بهتر مشاهده و مشخص میشود.

سپس پوست را ضد عفونی کرده و سپس پزشک متخصص سوزن را در فضای تعیین شده وارد و دارو را در آن محل تزریق میکند البته قبل از تزریق دارو ابتدا کمی از مایع بیرون کشیده میشود تا از محل صحیح ورود سوزن اطمینان حاصل شود.

با تزریق دارو به تدریج بدن شما از کمر به پایین بی حس خواهد شد.

در اولین روزهای پس از سزارین تا چه حد بهبودی حاصل می شود؟

ممکن است بلافاصله پس از جراحی احساس گیجی و تهوع داشته باشید بسیاری از مادران در سراسر بدن احساس خارش دارند به خصوص آنهایی که از طریق اپی دورال یا اسپینال مواد | مخدر دریافت کردهاند در چنین صورتی به پزشک اطلاع دهید تا داروی ضد خارش برایتان تجویز کند در اولین فرصت از پرستار بخواهید که به شما آموزش دهد چگونه در وضعیت خوابیده به پهلو به نوزاد شیر دهید ممکن است در محل برش سزارین احساس درد و بی حسی کنید محل برش ممکن است کمی برآمده و برجسته بوده و از رنگ پوست تان تیره تر باشد.

هضم سرفه یا سایر فعالیتهایی که در محل شکم فشار ایجاد نماید در روزهای اول دردناک خواهد بود ولی رفته رفته بهتر خواهید شد.

پرستار شما در ابتدا هر چند ساعت یکبار به بالین شما خواهد آمد که وضع شما را کنترل کرده و به شما کمک نماید. پرستار علائم حیاتی شما را کنترل ،میکند شکم شما را لمس می کند تا ببیند آیا رحم سفت است و میزان خونریزی شما را بررسی می.کند نظیر هر زنی که به تازگی بچه ای به دنیا آورده است شما نیز دارای ترشحاتی خواهید بود که حاوی خون و بافتهای اضافی کننده شده از حفره درونی رحم است. ممکن است اولین بار که از جا بر می خیزید مقدار زیادی از این ترشحات خونی دفع شوند و تا ۳ یا ۴ روز اول به رنگ قرمز روشن خواهد بود.

داشتن درد بعد از سزارین طبیعی است و پرستار به شما مسکن تجویز شده توسط پزشک را خواهد داد.